


PROYECTO DE ROTULO / PROSPECTO

CAFIASPIRINA
ASPIRINA 500 mg
CAFEINA 40 mg

Analgésico - Antiinflamatorio -Antifebril
Comprimidos

7 9 9 5
22 JUL 2016
Industria Argentina



Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene CAFIASPIRINA?

Cada comprimido de **CAFIASPIRINA** contiene: Como ingredientes Activos; 500 miligramos de Aspirina, 40 miligramos de Cafena y como Ingredientes no activos; Almidón de maíz.

ACCION TERAPEUTICA

Analgésico (calma el dolor) – Antiinflamatorio (reduce la inflamación) – Antifebril (baja la fiebre)

¿Para qué se usa CAFIASPIRINA?

CAFIASPIRINA está indicada para el alivio sintomático de dolores leves o moderados, como dolores de cabeza, dentales, de espalda, musculares y articulares. Alivio de síntomas de resfríos y estados gripales y para reducir la fiebre.

¿Qué personas no pueden recibir CAFIASPIRINA?

No use este medicamento si:

- Tiene Alergia a alguno de los componentes de la formula o similares.
- Padece hemorragias
- Padece ulcera del estómago o duodenal.
- Padece enfermedad del hígado o riñones.
- Padece asma, diabetes, hipertensión arterial no controlada (aumento de la presión arterial), gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea.
- Consume tres (3) o más vasos diarios de bebida alcohólica.
- Está consumiendo bebidas, comidas o medicamentos que contengan cafena.
- No debe ser tomado con anticoagulantes, medicación para la diabetes, diuréticos, medicación para el corazón, corticoides
- Menores de 15 años

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar CAFIASPIRINA?

Debe ser tomada la menor dosis por el periodo de tiempo más corto necesario para aliviar sus síntomas. Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de tomar este medicamento.

No administre este medicamento a menores de 15 años en caso de síntomas de GRIPE o VARICELA ya que puede incrementar el riesgo a desarrollar SÍNDROME DE REYÉ (Es un daño cerebral agudo acompañado de trastornos hepáticos y su origen es desconocido. Este síndrome se ha presentado en niños a quienes les habían administrado ácido acetilsalicílico (*aspirina*) cuando

CAFIASPIRINA BAYER S.A.
R. Gutiérrez 3652 (BARRIO DEL MUNRO)
SILVIA FABRIZIO
APODERADA

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERONICA CASARO
CO-DIRECTORA TECNICA
MATRICULA PROFESIONAL 13119

7/11

tenían varicela o gripe. Entre los síntomas que produce están los vómitos muy frecuentes, alteraciones en el comportamiento, confusión, somnolencia e incluso coma



Las personas mayores de 65 años no deben tomar este medicamento sin consultar con su médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Consulte al médico si el dolor persiste más de 5 días, o si la fiebre persiste por más de 3 días, también si se observa empeoramiento de los síntomas o aparición de nuevos síntomas.

¿Cómo se usa CAFIASPIRINA?

Adultos: 1 comprimido cada 6 hs, si es necesario, hasta un máximo de 6 comprimidos en 24 hs.

No tome más de la dosis máxima indicada.

Tome los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia después de las comidas o con algún alimento.

Este medicamento no debe administrarse a niños menores de 15 años sin consultar al médico.

No tomar por más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

¿Qué cuidados tener mientras toma CAFIASPIRINA?

Suspenda su uso y consulte a su médico inmediatamente si:

- Experimenta alergias como erupción en la piel y picazón.
- Nauseas, vértigos, vómitos o irritación del estómago con o sin pérdida de sangre por materia fecal.
- Alteraciones sanguíneas, moretones, sangrado.
- Se producen mareos, nerviosismo, taquicardia (aumento de la frecuencia cardiaca), debido a la cafeína.

¿Qué hacer ante una sobredosis, o si tome más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centro de toxicología:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: 4962-6666/2247
- Policlínico Dr. A. Posadas: 4654-6648/4658-7777
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

¿Tiene usted alguna pregunta?

Llame sin cargo al 0800 888 8020 de lunes a viernes de 9 a 16 h, o al servicio ANMAT responde 0800 333 1234

No utilice este medicamento luego de la fecha de vencimiento.


Conservación: Almacenar a temperatura ambiente inferior a 25°C.

Cafiaspirina

BAYER S.A.
R. Gutiérrez 3652 (B1605EHD) Monte
SILVIA FABRIZIO
APROBADA

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERONICA CASARO
CO-DIRECTORA TECNICA
MATRICULA PROFESIONAL 13118

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE
CON MEDICO Y/O FARMACÉUTICO.**



995

® Marca registrada de **Bayer AG**, Alemania.

Fabricado según fórmula original y bajo licencia de **Bayer AG**, Alemania, en Calle 8 entre 3 y 5,
Parque Industrial Pilar, por BAYER S.A., Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD), Munro, Buenos Aires
Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado N° 9.388


Fecha de última revisión: 10/10/2013

Disposición: 753/12

Presentación: Envases conteniendo 10, 20 y 30 comprimidos

Envases conteniendo 200, 500 y 1.000 comprimidos para uso hospitalario exclusivo


BAYER S.A.
R. Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro
SILVIA FABRIZIO
APODERADA


BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERONICA CASARO
CO-DIRECTORA TECNICA
MATRICULA PROFESIONAL 13119